

واکسین سوم برای کسانیکه سیستم دفاعی بدنشان ضعیف باشد باشندگان کانتی فیرفس که باثر بیماری، یا با خاطر گرفتن دارو ها، یا با خاطر تداوی شیمیایی سیستم دفاعی بدنشان ضعیف شده باشدو دودوره واکسین کووید ۱۹، فایزر یا مدورنا را گزشتانده اند اینک آنها مستحق واکسین سوم کووید ۱۹ شده و میتوانند که آنرا از دیپارتمنت صحت فیرفس کانتی اخذ نمایند.

توصیه، و بعداً FDA این واکسین از طرف دیپارتمنت غذا و دارو یا تصویب گردید. دیپارتمنت صحت ویرجینیا بروز جمعه CDC توسط، سیزدهماگست این اعلامیه را نشر نمود و اعضای حوزه، دیپارتمنت صحت ویرجینیا دست بکار شده و این واکسین سوم را بدسترس مستحقین بتاریخ چهاردهم اگست قرار داد.

واکسین سوم باید بیست و هشت روز بعد از دوره دوم واکسین مدورنایا واکسین فایزر گرفته شود. نو جوانان ۱۲ ساله و بالاتر از و بالاتر از سن Pfizer-BioNTech، آن میتوانند فایزر بایونت، را بگیرند، واکسین Moderna، ۱۸ ساله میتوانند واکسین مدورنا سوم هم باید از همان نوع که گرفته اند باشد. دیپارتمنت صحت را بدست دارد. واکسین Pfizer فیرفس کانتی فعلاً واکسین فایزر کووید ۱۹ بهمه جاهای به عینروز بدون درخواست وقت قبلی برایهمه دب لیو، دب لیو واک سین.گ ف آماده است شما باید با

WWW.Vaccine.Gov بتماس شوید.

برای یافتن محل واکسین که بشما نزدیک باشد به وبسایت (Health Department Website) دی پارتمنت صحت کنید کسانیکه واکسین مدورنا را گرفته به وبسایت مراجعه

## مراجعه کنند. کدام اشخاص میتوانند این [WWW.Vaccine.Gov](http://WWW.Vaccine.Gov) واکسین را بگیرند؟

بعد از گرفتن بار اول و دوم واکسین کووید ۱۹ واکسین سوم به مقدار اقلتوصیه میشود. کسانیکه سیستم دفاعی بدن شان ضعیف است و این حالات را دارند:

. در حالت علاج کردن تومور یا سرطان خونی میباشند.

عضو از اعضاء بدن را پیوند میکنند و دوامصرف میکنند.

کسانیکه سلول بنیادی پیوند میزنند و یا دارو مصرف میکنند -

. که سیستم دفاعی بدن شان بلند برود

کسانیکه سیستم دفاعی بدن شان بطور او سط یا بالاتر ضعیف است -

که بنام های (e.g., DiGeorg Syndrome, Wiskott-Aldrich Syndrome) میشود .

دارند و معالجه نکرده اند HIV کسانیکه ویروس اچ آی ، ووی -

prednisone با ۲۰ میلی ( Corticosteroid ) کسانیکه معالجه -

در روزدارند و این باعث ضعیف شدن سیستم دفاعی بدن میشود

کسانیکه میخواهند واکسین سوم را بگیرند پارتمنت صحت

فیر فکساتی از آنها خواستار ثبوت وضع صحی انها نمیباشد. گرچه

گواه براینکه آیا واکسین سوم میتواند سیستم دفاعی بدن را قوی

بسازد وجود ندارد اما باز هم کمک میشود

بر علاوه گرفتن واکسین سوم باید بطور احتیاط ماسک بپوشید،  
فاصله شش متری را رعایت کنید، از مناطق بیرونی و حبس شده  
پرهیز کنید، و همیشه با داکتر معالج خود به تماس باشید.

در باره واکسین جانسن، جانسن که آیا انهم احتیاج به دوره سوم دارد  
یانه، معلومات در دست نیست. برای کسانیکه واکسین جانسن، جانسن  
را گرفته اند ضرورت به مطالعه کافی دارد که فهمیده شود که آیا بدن  
را از وایروس ایمن میکند یا نه؟

مرکز کنترول امراض و جلوگیری از آنها بکسانیکه  
واکسین جانسن، جانسن را گرفته اند واکسین سوم مدورنا، یا فایزر را  
توصیه نمیکند.

کان کاآن برای معلومات بیشتر در باره واکسین کووید ۱۹ به  
در (Fairfax County Website) ای تف یرف کس به وب س  
باره ساعات کار، مناطق و دیگر معلومات مفید تماس بگیرید.